

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ"
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА
И ИНФОРМАТИКА
ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

KONSTANTIN PRESLOVSKY
UNIVERSITY OF SHUMEN - BULGARIA
FACULTY OF MATHEMATICS
AND COMPUTER SCIENCE
FACULTY OF TECHNICAL SCIENCE

МАТМАТЕХ 2012

СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ

Том 1

Математика

**Компютърна информатика и
компютърни информационни технологии**

**Проблеми на обучението по
математика и информатика**

Икономика и управление

МАТМАТЕХ 2012

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL
CONFERENCE

Volume 1

Mathematics

**Computer Informatics and
Computer Information Technologies**

**Problems in Teaching
Mathematics and Informatics**

Economics and Management



УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
"ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

В процессе решения учащимися предложенных заданий можно использовать разные методы обучения - алгоритмический, проблемный, исследовательский, что способствует повышению прочности знаний по математике и развитию познавательных и творческих способностей учащихся.

При изучении геометрических преобразований графиков функций целесообразно использовать различные информационно-коммуникационные технологии как с обучающими, так и контролирующими целями. Их применение позволяет ярко и динамично продемонстрировать построение различных графиков функций, сократить время на освоение материала, повысить мотивацию, способствует формированию и совершенствованию знаний и умений обучающихся.

К ВОПРОСУ МОТИВАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ

Игорь В. Калашников, Евгения И. Калашникова

ABSTRACT: Article focuses on motivation in learning mathematics.

KEYWORDS: motivation, mathematics of logic, problem

Мотивацию при изучении математической логики мы видим в постановке и решении практических задач реального содержания.

Рассмотрим на примере такую реальную ситуацию. Трех сотрудников A , B и C некоторого жилищно-коммунального объединения обвиняют в том, что они причастны к тому, что на складе исчез прибор. Обвиняемые дали такие показания:

A : B виновен, а C невиновен;

B : A невиновен или C виноват;

C : Я невиновен, но хотя бы один из A или B виновен.

В каких случаях эти показания совместимы (конъюнкция с высказываниями сотрудников A , B и C будет выполняема)? Кто же из трех сотрудников жилищно-коммунального объединения A , B , C причастен к исчезновению прибора если предположить, что все их высказывания истинны?

Зная, что высказывание это предложение которое может быть истинным или ложным и применяя определения основных логических операций, можем математизировать данную проблему.

Обозначим: A виновен – a ; B виновен – b ; C виновен – c .

Тогда каждое из свидетельств можно записать так:

A : $b \wedge \bar{c}$;

B : $\bar{a} \vee c$;

C : $\bar{c} \wedge (a \vee b)$.

Чтобы проверить данные высказывания на совместимость составим общую формулу

$$(b \wedge \bar{c}) \wedge (\bar{a} \vee c) \wedge (\bar{c} \wedge (a \vee b)) \quad (1)$$

и рассмотрим все возможные случаи ее истинностных значений.

a	b	c	\bar{a}	\bar{c}	$a \vee b$	$b \wedge \bar{c}$	$\bar{a} \vee c$	$\bar{c} \wedge (a \vee b)$	Formula
1	1	1	0	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	1	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0

Из таблицы видим, что высказывания совместимы только в одном варианте. Из нее также видим, – если все показания правда, то виновен B .

Использовать данный метод целесообразно при малом количестве подозреваемых. При их большем количестве таблица становится объемной (число строк данной таблицы находят по формуле $N = 2^n$, где n – количество подозреваемых). Поэтому формулу, как правило упрощают, согласно законам логики. Приведем некоторые из них ниже:

$$a \wedge a \equiv a;$$

$$a \vee a \equiv a;$$

$$a \wedge b \equiv b \wedge a;$$

$$a \vee b \equiv b \vee a;$$

$$(a \wedge b) \wedge c \equiv a \wedge (b \wedge c);$$

$$(a \vee b) \vee c \equiv a \vee (b \vee c);$$

$$a \wedge (b \vee c) \equiv a \wedge b \vee a \wedge c;$$

$$a \vee (b \wedge c) \equiv (a \vee b) \wedge (a \vee c);$$

$$a \wedge T \equiv a;$$

$$a \vee F \equiv a;$$

$$a \vee T \equiv T;$$

$$\bar{\bar{a}} \equiv a;$$

$$a \wedge \bar{a} \equiv F;$$

$$a \vee \bar{a} \equiv T;$$

$$\bar{T} \equiv F;$$

$$\bar{F} \equiv T;$$

$$\overline{a \wedge b} \equiv \bar{a} \vee \bar{b};$$

$$\overline{a \vee b} \equiv \bar{a} \wedge \bar{b};$$

$$a \rightarrow b \equiv \bar{a} \vee b;$$

$$a \leftrightarrow b \equiv (a \rightarrow b) \wedge (b \rightarrow a),$$

где a, b, c – произвольные высказывания, T – постоянно истинное высказывание, F – постоянно ложное высказывание.

Отмеченные выше тождества действительно имеют место, их легко проверить путем составления соответствующих таблиц истинности и их анализа.

Используя отмеченные в тождествах свойства логических операций, можно упростить логическую формулу (1). Процесс упрощения данной формулы, может быть таким:

$$(b \wedge \bar{c}) \wedge (\bar{a} \vee c) \wedge (\bar{c} \wedge (a \vee b)) \equiv ((b \wedge \bar{c}) \wedge \bar{a}) \vee ((b \wedge \bar{c}) \wedge c) \wedge ((\bar{c} \wedge a) \vee (\bar{c} \wedge b)) \equiv$$

$$\equiv (b \wedge \bar{c} \wedge \bar{a}) \vee (b \wedge \bar{c} \wedge c) \wedge ((\bar{c} \wedge a) \vee (\bar{c} \wedge b)) \equiv b \wedge \bar{c} \wedge \bar{a}.$$
 Поэтому формула (1) равносильна формуле $b \wedge \bar{c} \wedge \bar{a}$. Составим таблицу истинности к формуле $b \wedge \bar{c} \wedge \bar{a}$.

a	b	c	\bar{a}	\bar{c}	Formula
1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0
0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0
0	0	0	1	1	0

Как видим эта таблица значительно проще предыдущей. Но результаты следствия те же.

Рассмотрим вторую ситуацию. Три свидетеля K, M, H дают показания с места автомобильной аварии. Нарушитель на автомобиле скрылся.

K : Нарушитель скрылся на синий тойоте.

M : Нарушитель скрылся на черном нисане.

H : Нарушитель скрылся на форде, но точно не синем.

Дополнительное расследование показало, что каждый из свидетелей правильно указал, или марку автомобиля, или цвет. Установить марку и цвет автомобиля, на котором скрылся нарушитель.

Для решения данной проблемы введем следующие обозначения:

a – синий цвет;

b – тойота;

c – черный цвет;

d – нисан;

e – форд.

Поскольку известно, что одно из двух: цвет или марку автомобиля каждый из свидетелей указывает правильно, то рассмотрим следующие истинные высказывания.

$$a \vee b \equiv T;$$

$$c \vee d \equiv T;$$

$$e \vee \bar{a} \equiv T.$$

Конъюнкция данных высказываний также является истинной, то есть: $(a \vee b) \wedge (e \vee \bar{a}) \wedge (c \vee d) \equiv T$. Упростим пошагово левую часть последнего тождества, используя логические законы.

$$1. (a \vee b) \wedge (e \vee \bar{a}) \equiv ((a \vee b) \wedge e) \vee ((a \vee b) \wedge \bar{a}) \equiv ((a \wedge e) \vee (b \wedge e)) \vee$$

$$\vee (a \wedge \bar{a}) \vee (b \wedge \bar{a}) \equiv (a \wedge e) \vee (b \wedge e) \vee (b \wedge \bar{a}) \equiv (a \wedge e) \vee (\bar{a} \wedge b) \vee (b \wedge e);$$

2. $(c \vee d) \wedge ((a \wedge e) \vee (\bar{a} \wedge b) \vee (b \wedge e)) \equiv ((c \vee d) \wedge (a \wedge e)) \vee$
 $\vee ((c \vee d) \wedge (\bar{a} \wedge b)) \vee ((c \vee d) \wedge (b \wedge e)) \equiv (c \wedge a \wedge e) \vee (d \wedge a \wedge e) \vee (c \wedge \bar{a} \wedge b) \vee$
 $\vee (d \wedge \bar{a} \wedge b) \vee (c \wedge b \wedge e) \vee (d \wedge b \wedge e) \equiv F \vee F \vee (c \wedge \bar{a} \wedge b) \vee F \vee F \vee F \equiv$
 $\equiv c \wedge \bar{a} \wedge b \equiv b \wedge c \wedge \bar{a}$. Итак $b \wedge c \wedge \bar{a} \equiv T$. Нарушитель скрылся на тойоте черного цвета.

Рассмотрим третью ситуацию. Четырех человек A, B, B, G , которых заподозрили в хищении имущества, задержала милиция. На допросе они дали следующие показания:

A : Это сделал B ;

B : Это сделал G ;

B : Это не я сделал;

G : B лжет, говоря, что это сделал я.

Дополнительное расследование показало, что правду сказал только один из них. Выяснить, кто совершил преступление и кто сказал правду.

В процессе решения данной задачи целесообразно использовать перебор вариантов и законы: $a \wedge \bar{a} \equiv F$ – противоречия, $a \vee \bar{a} \equiv T$ – исключенного третьего.

Предположим, что высказывания A является истинным, тогда высказывания B, B и G должны быть ложными, но из того, что A является истинным вытекает истинность высказывания B . Поскольку знаем, что правду сказал только один из них, то высказывание A истинным быть не может, т.е. A – ложь.

Пусть тогда B сказал правду, тогда рассказ B также истина. Используя рассуждения аналогичные предыдущим, приходим к тому, что B соврал.

Предположим тогда, что B сказал правду, но тогда одно из трех показаний A, B, G также истинны, а этого не может быть по условию задачи.

Последний случай. Предположим, что показания G являются правдой. Исходя из этого – свидетельства A, B и B должны быть ложными. Это не мог сделать B или G , так как показания A и B ложь. Подозреваемый B говорит, что это не он сделал, но это тоже неправда. Так что это могли сделать только подозреваемые A и B . Если это сделал A , свидетельство B также есть правда, но этого не может быть по условию. Так что это сделал B .

Изучая математическую логику целесообразно предлагать интересные задачи, примером одной из них является следующая.

Есть три участника A, B, B такой игры. В одном из двух ящиков скрытая некоторая вещь, и у каждого из этих ящиков есть по одному участнику: у первого ящика участник A , а у другого – участник B . Оба участника A и B знают, в каком из этих двух ящиков спрятана вещь, но один из них говорит только правду, а второй только неправду. Участник B об этом знает. Ему предлагается задать только один вопрос одному из участников A, B такой, чтобы с полученного ответа в виде «да» или «нет», он смог бы узнать, в каком ящике содержится спрятанная вещь. Как участнику B сформулировать вопрос, чтобы справиться с поставленной задачей?

Один из вариантов формулировки вопрос участника B : «Правда ли что, в ящике, у которого ты стоишь, находится предмет, эквивалентно тому, что ты всегда говоришь правду?» При ответе «Да» предмет в ящике, а при ответе «Нет» его там нет.